

| nom commun | genre espèce | famille | observations |
|---|--------------------|--------------|--|
| osmie cornue | osmia cornuta | magachilidae | dans les tiges creuses ou trous de mur |
| | mégachile lagopoda | | |
| | halictus scabiosae | | |
| la scolie à front jaune (scolie à anthophore) | scolia hirta | | Ces guêpes solitaires creusent le sol meuble à la recherche de larves de coléoptères <i>Cetoniidae</i> (en particulier <i>Cetonia aurata</i>), ainsi que de <i>Scarabaeidae</i> . Puis elles parasitent les larves en pondant leurs œufs sur elles pour nourrir leur progéniture. |
| punaise verte | | | |
| punaise verte ponctuée | | | |
| graphosome d'Italie (ou punaise arlequin) | | | très communes sur les ombellifères |
| pentatome des haies | | | |
| la punaise diabolique | | | |
| la punaise bisonia | | | |
| le pyrrhocoris (gendarme) | | | |
| punaise tigre du platane (dentelles) | | | |
| la cicadelle | | | |
| drap mortuaire | | | |
| cantharidae | | | |
| chrysomèle | | | |
| | septempinosum | magachilidae | |
| le syrphpe ceinturé | | | ses larves sont des prédatrices de pucerons |
| le cétoine dorée | | | |
| bourdon des jardins | | | |
| bourdon des champs | bombus pascoarum | | |
| bourdon terrestre | | | |
| abeille domestique | | | |
| coocinelle à 7 points | | | |
| doriphores | | | |
| xylocopine | | | |
| frelon asiatique | | | |
| frelon européen | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |